

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DLP 17-6-81807520

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative, rue Pélissier, 63034 Clermont Ferrand Cedex

Téléphone (73) 92-42-68 - Poste 477

ABONNEMENT ANNUEL :

70.00 F

Régie de Recettes de la D.D.A.
Sous-Régisseur de Recettes
du Service de la Protection
des Végétaux
Cité Administrative - Rue Pélissier
63034 Clermont Ferrand Cedex
C. C. P. Clermont-Ferrand 5.503-17

BULLETIN DU 12 JUIN (Edition Générale 1981 - N° 17)

N° 195

V I G N E

MILDIOU -

Les premiers foyers de cette maladie ont été observés dans la région de SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE et de CHEMILLY (Allier) fin Mai, début Juin.

Les périodes orageuses récentes ont été propices aux contaminations primaires et aux repiquages à partir des foyers existants. Il y a donc lieu de maintenir la protection du vignoble.

Dans le cas d'utilisation de produits préventifs, intervenir dès réception de cette note.

Ce traitement devra être effectué avant le 17 Juin, si l'on a opté pour les produits systémiques.

OÏDIUM -

Ne pas négliger la lutte contre cette maladie.

GRANDES CULTURES

CÉRÉALES

Les blés sont en général au stade floraison.

Des attaques de rouille jaune tardives sont notées dans diverses régions.

Il est rappelé qu'un traitement peut encore être effectué jusqu'à 10 jours après la fleur.

DIRECTEUR-GERANT : J. THIAULT

P... 1984

Des visites de parcelles sont donc encore nécessaires de façon à déceler la présence de cette maladie.

P O M M E S D E T E R R E

MILDIOU -

A la suite des dernières pluies orageuses, des contaminations ont pu se produire.

Il est conseillé d'effectuer un traitement dans les situations précoces où cette culture atteint ou dépasse une vingtaine de centimètres de hauteur.

Utiliser l'une des matières actives suivantes :

- préventives : captafol, chlorothalonil, cuivre, folpel, manèbe, mancozèbe, métirame de zinc, zinèbe, ainsi que les associations de très nombreuses spécialités organiques ou organo cupriques
- pénétrantes : cymoxanile (en association) : FULVAX, REMILTINE, REMILTINE S
- systémiques : métalaxyl (en association) : ACYLON bleu, ACYLON F, ACYLON P.

LE CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION
PHYTOSANITAIRE,

A. FARGEIX